



# 4種混合ワクチン(DPT・不活化ポリオ) DTワクチン 不活化ポリオワクチン 接種予定の保護者の方へ

## D : ジフテリアとは？

- ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。感染は主にのどですが、鼻にも感染します。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などで、偽膜と呼ばれる膜ができて窒息死することもあります。

## P : 百日せきとは？

- 百日せき菌の飛沫感染で起こります。せきがひどくなり、顔をまっ赤にして連続的にせき込むようになります。乳幼児はせきで呼吸ができず、くちびるが青くなったり（チアノーゼ）けいれんが起きることがあります。※最近、長びくせきを特徴とする思春期や成人の百日せきがみられ、乳幼児への感染源となり重症化する例があります。

## T : 破傷風とは？

- 土の中にいる破傷風菌が、傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために、全身のけいれんを起こし死亡することもあります。土中に菌がいるため、感染する機会は常にあり、軽い刺し傷も原因になります。

## ポリオとは？

- 「小児マヒ」といわれ、ヒトからヒトへ感染します。腸管に入ったウイルスが脊髄に入り、手や足に麻痺があらわれ一生残ることがあります。昭和35年に大流行がみられ、予防接種の導入によりおさまりました。





## ワクチンを接種したあとは？（副反応）

- 予防接種を受けた後30分間は、接種会場でおさまの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしましょう。
- 副反応は、注射部位の発赤・しこり・発熱・腫れ下痢などがあります。極めてまれに強いアレルギーや血小板減少性紫斑病などの注意が必要です。

## 健康被害の救済制度

万が一、市町村の実施する予防接種で健康被害が生じた場合は、国の審議の下、予防接種法に基づく給付が受けられます。

## 接種スケジュール

対象年齢	接種方法・回数	接種スケジュール			
<b>4種混合・不活化ポリオ</b>		1回目	2回目	3回目	追加接種
生後3ヶ月～7才半	4回接種				
		3～8週間隔	3～8週間隔	1年～1年6ヶ月の間隔	
<b>DT</b>					
小学校6年生	1回接				

※4種混合ワクチンは、原則としてDPTとポリオ未接種者に限ります。



# 4種混合ワクチン(DPT・不活化ポリオ) DTワクチン 不活化ポリオワクチン 接種予定の保護者の方へ

## ● ワクチンについて

- ・4種混合ワクチンは、DPTと不活化ポリオの混合ワクチンです。  
定期（接種するよう努めなければならない）予防接種です。

## ● 受ける場所

- ・別紙の個別予防接種指定医療機関よりご自分で選び接種して下さい。

## ● 対象者

- 4種混合・不活化ポリオ ・生後3ヶ月 ～ 7才半
- DT ・小学校6年生

## ● 受け方

- ・接種回数とスケジュールは、裏面を確認後、医師にご相談下さい。

## ● 接種料金


- ・対象年齢時は無料（公費負担）です。

## ● 持参するもの

- ・予診票
- ・親子健康（母子）手帳を持参。

※BCGの予定を確認し、接種機会を逃さないよう計画的に接種しましょう

## 予防接種のための必要な間隔



予診表の再通知について

通知以外の事について

お問い合わせ  
宮古島市健康増進課予防係 73-1978