



ヒブワクチン接種について

ヒブ(Hib)とは？

- ヒブ（インフルエンザ菌b型）は、インフルエンザウイルスとは別のものです。
- 乳幼児の化膿性髄膜炎、敗血症、喉頭蓋炎などの重い全身感染症の原因となっています。
- 髄膜炎は細菌性髄膜炎の中でもっとも多く年間約400人が発症し、約11%が予後不良といわれています。
- 年齢的には4ヶ月～1才までの発病が過半数を占めています。

ワクチンを接種したあとは？（副反応）

- 予防接種を受けた約30分間は、接種会場でお子さまの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- 副反応として、接種部位の紅斑・腫れ・しこり・痛み・発熱などが認められています。

健康被害の救済制度


万が一、市町村の実施する予防接種で健康被害が生じた場合は、国の審議の下、予防接種法に基づく給付が受けられます。

接種対象者とスケジュール

対象年齢 (接種開始年齢)	接種回数	接種スケジュール
生後 2～6ヶ月	4回接種	(※1) 初回1回目 → 初回2回目 → 初回3回目 → 追加 27～56日の間隔 27～56日の間隔 7～13ヶ月の間隔
生後 7～11ヶ月	3回接種	(※1) 初回1回目 → 初回2回目 → 追加 27～56日の間隔 7～13ヶ月の間隔
1才～4才	1回接種	1回

(※1) 1才を超えた場合、未接種分の初回接種は受けられません。最後の接種から27日以上おいて、追加接種のみを受けて下さい。

予防接種のための必要な間隔



※接種した翌日から数えます。



ヒブワクチン接種予定の 保護者の方へ

いつ、どこで受けるの？

● ワクチンについて

- ・ヒブワクチンは、定期（接種するよう努めなければならない）予防接種です。

● 受ける場所

- ・別紙の個別予防接種指定医療機関よりご自分で選び接種して下さい。

● 対象者

- ・生後2ヶ月～5才の誕生日の前日まで

● 受け方

- ・接種回数とスケジュールは、裏面を確認後、医師とご相談下さい。
その際、集団接種（平良保健センターや伊良部地区で行われる予防接種）の日程と重ならないように注意しましょう。

● 接種料

- ・対象年齢時は無料（公費負担）です。

● 持参するもの

- ・予診票
- ・親子健康(母子)手帳を持参

※集団接種の予定を確認し、接種機会を逃さないよう計画的に接種しましょう

予診表の再通知
について

お問い合わせ

宮古島市健康増進課予防係
宮古島市平良保健センター

73 - 1978

73 - 4572

通知以外の事
について