



BCG接種について(結核)

結核とは？

●結核菌が人から人へ感染（咳などをすることでうつる飛沫感染）することで起こります。日本の結核患者はかなり減少しましたが、沖縄県内でも400人を超える患者が毎年発生しており、大人から子どもへ感染する事も少なくありません。また、結核に対する抵抗力はお母さんからもらうことができませんので、生まれたばかりの赤ちゃんもかかる心配があります。特に、乳幼児は結核に対する抵抗力が弱いので、全身性の結核症にかかったり、結核性髄膜炎になることもあり、重い後遺症を残す可能性があります。

接種後の経過と副反応は？

●接種後10日頃に接種したところに赤いポツポツができ、一部に小さいうみができることがあります。その後は、かさぶたができて接種後3か月までにはなお、小さなきずあとが残るだけになります。これは、BCG接種により抵抗力（免疫）がついた証拠です。包帯をしたり、バンソウコウをはったりしないで、そのまま普通に清潔を保って下さい。ただし、接種後3か月を過ぎても接種のあとがジクジクしているようなときは医師の診察を受けましょう。副反応としては、接種をした側のわきの下のリンパ節がまれに腫れることがあります。通常、放置して様子を見てかまいませんが、ときにただれたり、大変大きく腫れたり、まれに化膿して自然にやぶれてうみが出ることがあります。その場合には医師の診察を受けましょう。

健康被害の救済制度

万が一、市町村の実施する予防接種で健康被害が生じた場合は、国の審議の下、予防接種に基づく給付が受けれます。

コッホ現象について

●お子さんが、BCG接種以前に結核に感染したことがある場合、接種後10日以内に接種部位が赤くなったり、はれたり、化膿することがあります。この現象が見られた場合は、すみやかに、接種した医療機関で診察を受けましょう。※接種後の診察は、保険適用診察になるため、料金が発生します。

BCG予防接種指定医療機関

医療機関名	電話	曜日	時間		予約
いけむら小児科	73-4970	月・火・木・金	11:30~12:15	13:30~15:30	必要
		木	11:30~12:15	—	
		土	—	13:30~15:30	
いしみねクリニック	75-5878	月・火・木・金	8:30~12:00	14:30~17:30	必要なし
		木・土	8:30~12:00	—	
ドクターゴン診療所	76-2788	月・火・水・金・土	8:30~11:30	—	必要
ひが小児科医院	73-1477	月~金	8:30~11:30	14:30~18:00	必要なし
		土	8:30~12:00	—	



BCG接種予定の保護者の方へ

● ワクチンについて

- ・BCGワクチンは、生ワクチンです。
定期（接種するよう努めなければならない）予防接種です。

● 受ける場所

- ・裏面の個別予防接種指定医療機関よりご自分で選び接種して下さい。

● 対象者

- ・生後5か月から1歳（1歳の誕生日の前日）まで

● 受け方

- ・1回

● 接種料金

- ・対象年齢時は無料（公費負担）です。

● 持参するもの

- ・予診票
- ・親子健康（母子）手帳を持参。

予防接種のための必要な間隔

予防接種との間隔

ヒブ・小児用肺炎球菌・DPT・不活化ポリオ・日本脳炎・インフルエンザ・B型肝炎・DT・子宮頸がんの予防接種を受けた人

6日以上あける

MR・BCG・麻しん・風しん・おたふくかぜ・水痘（みずぼうそう）・ロタ予防接種を受けた人

27日以上あける

他の予防接種を受ける時

病気との間隔

ひきつけ（けいれん）を起こしたことがある人
その他、病気で現在治療中の人は、主治医と相談のうえ、接種してください

麻しん・風しん・おたふくかぜ・水痘（みずぼうそう）が治ってから

2～4週間以上あける

手足口病・りんご病・突発性発疹・インフルエンザ・かぜなどが治ってから

1～2週間以上あける

※接種した翌日から数えます。

予診表の再通知について

通知以外の事について

お問い合わせ

宮古島市健康増進課予防係 73-1978
宮古島市平良保健センター 73-4572